

表三 [Q1] 請問你認為邊一個年齡組別既男士最有機會患上前列腺癌？(讀出答案，只選一項)

	頻數	百分比(基數=530)
20 歲以下	1	0.1%
20 至 29 歲	7	1.3%
30 至 39 歲	42	7.9%
40 至 49 歲	111	20.9%
50 歲或以上	335	63.2%
唔知／難講	35	6.5%
合計	530	100.0%

表四 [Q2] 你知唔知道前列腺癌係香港男性癌症發病率中排行第一，第四，第九，定係第十五位？

	頻數	百分比(基數=530)
第一位	39	7.4%
第四位	217	40.9%
第九位	93	17.5%
第十五位	23	4.3%
其他 (見下表)	4	0.8%
唔知／難講	154	29.0%
合計	530	100.0%
其他答案而未能歸類者		
第三位	1	0.2%
第六位	1	0.1%
第七位	1	0.2%
第十位	1	0.3%
小計	4	0.8%

表五 [Q3] 咁你認為早期前列腺癌一般治療後既存活率大概會有幾多年？(讀出答案，只選一項)

	頻數	百分比(基數=530)
不超過一年	6	1.2%
不超過五年	79	14.9%
不超過十年	62	11.7%
十年以上	256	48.3%
唔知／難講	126	23.9%
合計	530	100.0%

表六 [Q4a] 就你所知，請問早期前列腺癌有冇任何病徵？

	頻數	百分比(基數=530)
有(追問 Q4b)	231	43.6%
沒有	143	27.1%
唔知／難講	156	29.4%
合計	530	100.0%

表七 [Q4b] (只問 Q4a 回答「有」的受訪者，次樣本=231)咁你認為以下係唔係前列腺癌既早期病徵？(讀出答案，次序由電腦隨機排列，可選多項)

	頻數	佔答案百分比 (基數=436)	佔樣本百分比 (基數=231)
小便緩慢	171	39.4%	74.3%
小便頻密	140	32.2%	60.7%
腹痛	101	23.3%	44.0%
以上皆否	11	2.6%	4.9%
唔知／難講	11	2.6%	4.8%
合計	436	100.0%	

表八 [Q5] 就你所知，晚期前列腺癌患者通常會有 d 乜野徵狀？(不讀答案，可選多項)

	頻數	佔答案百分比 (基數=690)	佔次樣本百分比 (基數=530)
小便緩慢	77	11.1%	14.5%
小便頻密	58	8.4%	10.9%
小便困難／痛	56	8.1%	10.6%
腹痛	50	7.2%	9.4%
血尿	45	6.6%	8.6%
失禁	18	2.6%	3.4%
行動不便	17	2.4%	3.1%
下體腫痛	16	2.3%	3.1%
嚴重骨痛	13	1.9%	2.4%
氣喘	6	0.9%	1.2%
消瘦	6	0.9%	1.2%
性功能障礙	6	0.8%	1.1%
食慾不振	4	0.5%	0.7%
骨折	2	0.3%	0.3%
其他(見下表)	11	1.7%	2.0%
唔知／難講	306	44.3%	57.7%
合計	690	100.0	
其他答案而未能歸類者			
小便混濁	2	0.4%	0.5%
容易疲倦	2	0.3%	0.4%
面黃	2	0.3%	0.3%
身體有腫脹	2	0.2%	0.3%
脾氣暴躁	1	0.1%	0.1%
精神唔好；貧血	1	0.1%	0.1%
失眠	1	0.1%	0.1%
肚脹	1	0.1%	0.1%
頭暈	1	0.1%	0.1%
小計	11	1.7%	2.0%

表九 [Q6] 若懷疑患上前列腺癌，你認為應該向哪些專科醫生求診？(不讀答案，可選多項；若被訪者回答“普通科醫生／家庭醫生”，請再重申是哪些專科醫生？)

	頻數	佔答案百分比 (基數=583)	佔次樣本百分比 (基數=530)
泌尿外科醫生	308	52.8%	58.1%
內科醫生	56	9.6%	10.5%
腫瘤科醫生	49	8.5%	9.3%
普通外科醫生	34	5.8%	6.4%
腎科醫生	9	1.6%	1.7%
前列腺科醫生	3	0.6%	0.6%
耳鼻喉科醫生	3	0.4%	0.5%
其他(見下表)	14	2.5%	2.7%
唔知／難講	107	18.3%	20.1%
合計	583	100.0	
其他答案而未能歸類者			
內分泌科醫生	2	0.4%	0.5%
中醫	2	0.3%	0.3%
男科醫生	2	0.3%	0.3%
家庭醫生	2	0.3%	0.3%
家庭計劃健康院	2	0.3%	0.3%
政府醫生轉介	1	0.2%	0.3%
私家醫生	1	0.2%	0.2%
專科醫生	1	0.2%	0.2%
性病科醫生	1	0.1%	0.1%
政府急症	1	0.1%	0.1%
婦科醫生	1	0.1%	0.1%
小計	14	2.5%	2.7%

表十 [Q7] 你認為以下既檢測可唔可以有效確診前列腺癌?(讀出 a-f 每項, 次序由電腦隨機排列)

	(a)		(b)		(c)		(d)		(e)		(f)	
	頻數	%	頻數	%	頻數	%	頻數	%	頻數	%	頻數	%
可以	135	25.4%	255	48.2%	254	47.8%	242	45.7%	219	41.2%	297	56.0%
唔可以	32	6.0%	153	28.8%	143	27.0%	77	14.6%	17	3.2%	112	21.2%
未聽過	235	44.3%	14	2.7%	15	2.8%	70	13.3%	157	29.6%	10	1.9%
唔知/ 難講	129	24.3%	108	20.3%	119	22.4%	140	26.4%	138	26.0%	111	20.9%
合計	530	100.0%	530	100.0%	530	100.0%	530	100.0%	530	100.0%	530	100.0%

檢測：

(a) PSA(Prostate Specific Antigen, 血清攝護腺特異抗原)

(b) 驗血及探肛檢查

(c) 超聲波

(d) 核磁共振

(e) 前列腺刺針活檢

(f) 電腦掃描

表十一 [Q8] 最後, 請問你認為係擴散階段之前, 以下邊 d 方法可以徹底治療前列腺癌?(讀出 1-5 項答案, 次序由電腦隨機排列, 可選多項)

	頻數	佔答案百分比 (基數=1,126)	佔次樣本百分比 (基數=530)
外科手術切除	347	30.8%	65.5%
放射治療	297	26.4%	56.1%
化學治療	243	21.6%	45.9%
荷爾蒙治療	83	7.3%	15.6%
冷凍治療	80	7.1%	15.0%
以上皆否	6	0.6%	1.2%
其他(見下表)	5	0.4%	0.9%
唔知/難講	66	5.9%	12.4%
合計	1,126	100.0	
其他答案而未能歸類者			
中醫	2	0.2%	0.4%
電療	2	0.2%	0.4%
小計	4	0.4%	0.9%

表十二 [Q9] 咁你認為以下邊 d 方法可以有效治療後期既前列腺癌？(讀出 1-5 答案，次序由電腦隨機排列，可選多項)

	頻數	佔答案百分比 (基數=989)	佔次樣本百分比 (基數=530)
外科手術切除	276	27.9%	52.1%
放射治療	256	25.9%	48.4%
化學治療	239	24.1%	45.0%
冷凍治療	50	5.0%	9.4%
荷爾蒙治療	48	4.9%	9.1%
以上皆否	29	3.0%	5.5%
其他(見下表)	5	0.5%	1.0%
唔知/難講	86	8.7%	16.2%
合計	989	100.0	
其他答案而未能歸類者			
電療	2	0.2%	0.4%
中醫	2	0.2%	0.3%
自然療法	1	0.1%	0.2%
小計	5	0.5%	1.0%